

Al terme municipal de l'Alcora es poden diferenciar 3 sistemes: forestal, agrícola i curs fluvial. En el sistema forestal podem destacar la presència de porc senglar, essent molt abundants els conills, les llebres i erizos. En dates recents també la cabra hispànica es fàcil de veure a l'entorn d'aquest embassament. Pel que fa a les aus, entre les més visibles cal destacar la presència de coloms salvatges, tórtors, merles, puputs, abellerols i estornells.

Al curs fluvial i en especial als embassaments podem trobar peixos com el barb comú i la carpa, també alguns introduïts com el black bass.

Entre les aus que trobem lligades al medi aquàtic destaquen la focha comuna, el martí pescador, la becada, els cabussets i la garsa reial.

Sistema aquàtic:

Fotxa comuna (Fulica atra)
Mesura uns 40 cm de llarg i té plomatge fosc i pic i frontal blancs. Principalment s'alimenta de plantes aquàtiques, llavors i herbes encara que també consumeix petits invertebrats com ara insectes, caragols i cucs. Podem observar-la per les vores inundades del embassament.

Martí pescador comú (Alcedo atthis)
Presenten molt de colorit que pot variar d'un espécimen a un altre. En general tenen les ales blaves-verdoses amb llampades metàl·liques i color taronja al ventre. S'alimenta de petits peixos que caça a través d'una ràpida i vertical cabussada des del seu punt d'observació. Després engoleix la presa sencera.

Becada (Scolopax rusticola)
Mesura uns 35 cm. Sol ser difícil de veure degut al seu plomatge de color terrós amb ocres i negres que la camufla perfectament al medi. Sol estar activa a les hores crepusculars, alimentant-se a les vores del pantà. Menja insectes, llamacs, miriàpodes i caragols que captura aforant el seu llarg pic en el fang.

Garsa reial (Ardea cinerea)
Pot arribar a tenir 2 metres d'envergadura d'ales i mesurar 1 metre d'altura. Té plomatge grisenc a la majoria del cos i la panxa i el cap blancs, a excepció de les joves que tenen el cap gris. Caça i menja a les vores de les aigües estancades. La seva dieta es compon de peixos, granotes i invertebrats.

Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
Au menuda d'uns 25 cm de llarg. Té plomatge terrós-gris obscur en les parts superiors i blanc a la panxa. A l'estiu coincidint amb l'època d'aparellament el plomatge del coll i les galtes es tornen d'una tonalitat rogenc i apareix una taca blanca al bec.

Viu al voltant de l'embassament entre la densa vegetació dels marges. S'alimenta de invertebrats aquàtics, peixets i culleretes.

En el término municipal de l'Alcora se pueden diferenciar 3 sistemas: forestal, agrícola y curso fluvial. En el sistema forestal podemos destacar la presencia de jabali, siendo muy abundantes los conejos, las liebres y erizos. En fechas recientes también la cabra hispánica es fácil de ver en el entorno de este embalse. En cuanto a las aves, entre las más visibles hay que destacar la presencia de palomas torcaes, tórtolas, mirlos, abubillas, abejurcos y estorninos.

En el curso fluvial y en especial en los embalses podemos encontrar peces como el barbo común y la carpa, también algunos introducidos como el black bass.

Entre las aves que encontramos ligadas al medio acuático destacan la focha común, el martín pescador, la becada, los zampullines y la garza real.

Sistema acuático:

Focha común (Fulica atra).
Mide unos 40 cm de largo y tiene plumaje oscuro y pico y frontal blancos. Principalmente se alimenta de plantas acuáticas, semillas y hierbas aunque también consume pequeños invertebrados como insectos, caracoles y gusanos. Podemos observarla por los bordes inundados del embalse.

Martí pescador común (Alcedo atthis)
Presentan mucho colorido que puede variar de un espécimen a otro. En general tienen las alas azules-verdosas con destellos metálicos y color naranja en el vientre. Se alimenta de pequeños peces que caza a través de una rápida y vertical zambullida desde su punto de observación. Después engulle la toma entera.

Becada (Scolopax rusticola)
Mide unos 35 cm. Suele ser difícil de ver debido a su plumaje de color pardo con ocres y negros que la camufla perfectamente al medio. Suele estar activa en las horas crepusculares, alimentándose en las orillas del pantano. Come insectos, babosas, miriápodos y caracoles que captura hundiendo su largo pico en el barro.



Becada (Scolopax rusticola)
Becada (Scolopax rusticola)

Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
Zampullín común o zampullín chico
Robert Clavel - Own work, CC BY-SA 2.0

Fotxa comuna (Fulica atra)
Fotxa comuna (Fulica atra)




Martí pescador comú (Alcedo atthis)
Martí pescador comú (Alcedo atthis)



Garsa reial (Ardea cinerea)
Garsa reial (Ardea cinerea)

Ruta Natural del Patrimoni Industrial			
1	Inici de ruta. Moli Nou	13	La Fonteta
2	Forn del Poero	14	Molí del Comte d'Aranda
3	Mina d'argila	15	Embassament
4	Teleries de Sant Vicent	16	Fauna
5	Assut i aljub de Sant Vicent	17	Font de la Ferrissa
6	Font de Sant Vicent	18	Mina de ferro
7	Molí de Matraca	19	Final ruta. Assut
8	Bassa la Vila		
9	Barranc del Pelegrí		
10	Roca Morena		
11	Assut		
12	Molí de Palomot		



Ruta Wildiör: a càrrec dels alcajines del Puèrtolas Pardo: Ferran Ferris, Raül Branchadell, Antonio Cunill i Àngel Guillen. Professor: Juan Carlos Olanía Porcar.

Garza real (Ardea cinerea)
Puede llegar a tener 2 metros de envergadura de alas y medir 1 metro de altura. Tiene plumaje grisáceo en la mayoría del cuerpo y la barriga y la cabeza blancos, a excepción de las jóvenes que tienen la cabeza gris. Caza y come en las orillas de aguas estancadas. Su dieta se compone de peces, ranas e invertebrados.

Zampullín común o zampullín chico (Tachybaptus ruficollis)
Ave pequeña de unos 25 cm de largo. Tiene plumaje pardo-gris oscuro en las partes superiores y blanco en el vientre. En verano coincidiendo con la época de apareamiento el plumaje del cuello y las mejillas se vuelven de una tonalidad rojiza y aparece una mancha blanca en el pico. Vive alrededor del embalse entre la densa vegetación de los márgenes. Se alimenta de invertebrados acuáticos, peces y cucharillas



Avís la col·laboració de i Con la col·laboració de

